

Q&A

今回は、みなさんからよくある**坐薬**についての質問にお答えしま〜す♪



Q: 坐薬がうまく挿入できないのですが...

A: 坐薬は、そのまま挿入する方が多いようですが、そのまま使用すると、坐薬で肛門の皮膚を引っ張ってしまい、挿入し難くなります。その場合、すべりをよくする為に油やお水を坐薬に少しつけるとスムーズに挿入できますよ♪


Q: 坐薬を挿入したのですが排便があり、すぐ出てしまいました。どうしたら良いですか？

A: 熱さましの坐薬の場合は、坐薬がとけたような物が5〜10分以内に排便などで出てしまったらもう一度使用するよう指導しています。

Q: 違う種類の坐薬を使用したい場合は？

A: 解熱剤とけいれん止めの坐薬を使用する場合は、できるだけ30分くらい間隔をあけて使用して下さい(けいれん止め優先)。けいれん止め以外の坐薬は、同時挿入でも可能です。

感染症発症動向調査 (期間: H18/10/21~11/20)



手足口病

口内炎がひどく、食事がとれない場合は、水分だけでもきちんと与えて下さい。(糖分・塩分のあるスポーツ飲料など可)



「ゆきだるま」
レイモンド・ブリッグス



文章のないめずらしい絵本ですが、やさしくあたたかみのある絵が、子供たちの心をとらえます。

雪の降らない沖縄ですが、寒い冬を想像しながら子供達と一緒にセリフを考えて読んでみてはいかがでしょうか？

年末年始のスケジュール

- ・ 12/31(日)~1/3(水)は、お正月のため休診します。
- ・ 1/4の木曜日は休診日ですが、連休明けのため午前中のみ診療いたします。

